


Dans 8 cas sur 10, lorsqu'une femme enceinte attrape la rubéole, le fœtus est infecté par la maladie avant de naître.

Que pouvez-vous faire?

- N'attendez pas d'être enceinte. Vous ne pouvez pas vous faire administrer le vaccin ROR si vous êtes enceinte;
- Faites faire une simple analyse de votre sang avant de devenir enceinte. Vous saurez alors si vous avez eu la rubéole durant votre enfance;
- Si l'analyse du sang révèle que vous n'avez PAS eu la rubéole durant votre enfance, vous devriez tout de suite vous faire administrer le vaccin ROR, avant de devenir enceinte;
- Après avoir reçu le vaccin, vous devriez attendre 1 mois avant de devenir enceinte. Vous serez alors protégée contre la maladie pendant votre grossesse.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter le centre de santé de votre région.



Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous à (867) 920-3367.

If you would like this information in another official language, contact us at (867) 920-3367.

Vaccin ROR

Rougeole

Oreillons

Rubéole



Qu'est-ce que le vaccin ROR?

Le vaccin ROR protège contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Le vaccin ROR est administré :

- aux enfants, à l'âge de 12 mois puis de 18 mois;
- aux adultes nés en 1970 ou après, et qui n'ont pas attrapé ces maladies ou qui n'ont pas été immunisés contre celles-ci;
- et peut entraîner des effets secondaires tels que des rougeurs, de l'enflure ou de l'inconfort à l'endroit où le vaccin a été injecté.

Certains enfants ont de la fièvre et des éruptions 7 à 12 jours plus tard et d'autres ressentent des douleurs temporaires aux articulations ou aux muscles. La fièvre, la douleur et les autres réactions de faible importance peuvent être diminuées en administrant de l'acétaminophène à l'enfant (Tempra©, Tylenol©, Advil©). Informez-vous auprès de votre infirmière.

Si, après l'immunisation, votre enfant a une forte fièvre qui ne s'apaise pas après lui avoir administré du Tylenol© ou si vous êtes inquiet à propos de votre enfant de quelque manière que ce soit, veuillez contacter :

La ligne d'information Télé-Soins au 1-888-255-1010 ou le centre de santé public ou communautaire de votre région.

Qu'est-ce que la rougeole?

- La rougeole est une des causes principales de morts pouvant être prévenues par un vaccin chez les enfants dans le monde entier;
- La rougeole commence par de la fièvre, un écoulement nasal, une toux et des rougeurs prononcées aux yeux;
- Après quelques jours, une éruption cutanée apparaît sur le visage et s'étend sur la poitrine, les bras et les jambes. Les yeux peuvent être sensibles à la lumière;
- La rougeole peut causer une infection aux oreilles ou une infection pulmonaire appelée pneumonie;
- La rougeole peut causer une infection aux oreilles ou une infection pulmonaire appelée pneumonie;
- Un enfant sur mille ayant attrapé la rougeole contractera une encéphalite (inflammation du cerveau), susceptible d'entraîner des convulsions, la surdité, des lésions cérébrales, et même la mort;
- Il n'existe aucun traitement contre la rougeole.

Qu'est-ce que les oreillons?

- Les oreillons sont une maladie infantile, que les adultes peuvent également contracter;
- Les oreillons peuvent causer de la fièvre, des maux de tête et une enflure des glandes dans les joues et la mâchoire. Cette enflure fait très mal et fait gonfler les joues;
- Les oreillons peuvent causer la méningite, une maladie grave qui infecte le liquide autour du cerveau et de la moelle épinière. Les oreillons peuvent aussi entraîner la surdité. Chez les hommes et les adolescents (garçons), les oreillons peuvent entraîner une enflure douloureuse des testicules et, chez les femmes et les filles, une enflure des ovaires;

- Si une femme enceinte attrape les oreillons durant les 3 premiers mois de sa grossesse, elle risque de faire une fausse couche.

Qu'est-ce que la rubéole?

- On l'appelle parfois la rougeole allemande;
- La rubéole est moins grave que la rougeole.

Chez les enfants, la rubéole cause une faible fièvre et un léger rhume, parfois suivis d'une éruption cutanée. Les ganglions du cou peuvent enfler. La maladie dure environ 3 jours.

Ce que les femmes enceintes devraient savoir à propos de la rubéole

- Si une femme enceinte attrape la rubéole au cours des 5 premiers mois de sa grossesse, elle peut transmettre la maladie à son bébé (ou son fœtus) alors qu'il est encore dans l'utérus.

