

La bactérie produit un poison qui est absorbé par les muscles du corps et provoque des spasmes musculaires graves. En dépit des progrès de la médecine moderne, six personnes sur dix qui contractent le tétanos en meurent.

La poliomyélite, ou polio, est causée par un virus. Cette maladie peut entraîner de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des douleurs musculaires intenses et la paralysie (les bras et les jambes ne bougent plus).

La polio peut également rendre les enfants très fatigués et peut causer des raideurs au cou et au dos. Certaines personnes atteintes de la polio ne se sentent jamais malades, tandis que d'autres peuvent devenir paralysées pour le reste de leur vie. La poliomyélite peut entraîner la mort.


L'Haemophilus influenzae de type b (Hib) est une maladie causée par des germes (bactérie) qui peuvent infecter le liquide autour du cerveau et de la moelle épinière (méningite).

De plus, ces bactéries peuvent causer une pneumonie (infection pulmonaire), une épiglottite (une inflammation et une enflure de l'ouverture de la trachée), des infections dans le sang, les articulations, les tissus mous de l'organisme et dans le revêtement extérieur du cœur.

Même si l'on traite cette maladie, environ un sur 20 enfants atteints de la méningite Hib va en mourir. Environ un enfant sur trois qui survit à la méningite Hib aura des dommages au cerveau.

Ces vaccins sont administrés gratuitement au centre de santé ou au service de santé public de votre région

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter le centre de santé de votre région.



Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous à (867) 920-3367. If you would like this information in another official language, contact us at (867) 920-3367.

Vaccin PediaceL



Le vaccin **Pediacel** offre la meilleure protection que votre enfant puisse recevoir contre les cinq maladies infantiles suivantes :

- la diphtérie
- la coqueluche (toux coquelucheuse)
- le tétanos
- la poliomyélite
- Hib (Haemophilus influenzae de type b)

Le vaccin **Pediacel** est administré, selon le calendrier canadien, aux enfants âgés de :



- 2 mois
- 4 mois
- 6 mois
- 4 à 6 ans
(sans l'Hib, vaccin
Quadracel)
- 18 mois

Votre enfant aura la meilleure protection contre ces maladies si on lui administre le vaccin au bon moment. Toutefois, il n'est jamais trop tard pour commencer.

Les effets secondaires communs, les jours suivant l'immunisation, sont :

- la fièvre
- l'irritation
- une légère enflure douloureuse à l'endroit où le vaccin a été injecté

- une petite bosse indolore à l'endroit où le vaccin a été injecté.

La fièvre, la douleur et les autres réactions de faible importance peuvent être diminuées en administrant de l'acétaminophène à l'enfant (Temptra©, Tylenol©, Advil©). Informez-vous auprès de votre infirmière.

Si, après l'immunisation, votre enfant a une forte fièvre qui ne s'apaise pas après lui avoir administré du Tylenol© ou si vous êtes inquiet à propos de votre enfant de quelque manière que ce soit, veuillez contacter :

La ligne d'information **Télé-Soins** au 1-888-255-1010 ou le centre de santé public ou communautaire de votre région.

Au sujet de ces maladies :

La diphtérie est une maladie causée par des germes (bactérie) qui infectent le nez, la gorge et la peau. Elle peut entraîner une difficulté à respirer ou une infection de la peau ou des oreilles. La diphtérie peut également causer une insuffisance cardiaque ou une lésion aux nerfs pour le reste de la vie de la personne atteinte.

La diphtérie cause la mort d'une personne sur dix qui la contracte.

Les bébés qui contractent cette maladie sont plus susceptibles d'en mourir que les adultes.

La coqueluche, ou toux coquelucheuse, est causée par des germes (bactérie) qui infectent la gorge et les poumons. Elle se caractérise par des quintes de toux si violentes qu'elles empêchent l'enfant de respirer correctement et peuvent même le faire vomir.

La toux peut durer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les enfants atteints de complications sérieuses, notamment une pneumonie, des convulsions, des dommages au cerveau, peuvent nécessiter une longue hospitalisation. Cette maladie peut également entraîner la mort.

Les adultes peuvent aussi attraper la toux coquelucheuse et tomber très malades.



Le tétanos, ou trismus, est causé par des germes (bactérie) qui vivent dans la saleté ou la poussière. Corps par une petite coupure ou une plaie ouverte.