

## Fiche de renseignements sur la syphilis

### Qu'est-ce que la syphilis?

- La syphilis est la plus ancienne maladie transmise sexuellement. Elle est causée par un organisme vivant (bactérie) qui pénètre dans la circulation sanguine par l'entremise des muqueuses ou d'une plaie. Cette bactérie est ensuite transmise dans tous les organes et les tissus de l'organisme.
- Les symptômes se manifestent généralement après un intervalle pouvant aller de dix jours à trois mois. Certaines personnes peuvent ne pas présenter de symptômes visibles. Les personnes atteintes de syphilis peuvent transmettre la maladie à d'autres personnes lors de relations sexuelles, même si elles ne présentent aucun signe ou symptôme de l'infection.

### Quels sont les symptômes?

- La maladie évolue en trois stades :
  - **Primaire** : Le premier signe est celui d'une plaie ouverte et indolore (un chancre) sur le pénis, l'anus, les grandes et les petites lèvres, le col de l'utérus, la gorge, les lèvres ou dans le vagin. Il est facile de ne pas se rendre compte que l'on présente ce signe, puisque les plaies guérissent et disparaissent d'une à cinq semaines après leur apparition. On peut également percevoir une enflure des ganglions lymphatiques;
  - **Secondaire** : Environ six semaines après l'apparition des premiers signes, des lésions ou des éruptions cutanées peuvent se manifester à la grandeur du corps, y compris sur les paumes des mains et la plante des pieds. De plus, il peut y avoir des lésions dans la bouche et sur les parties génitales. La maladie peut également entraîner de la fièvre, une enflure des glandes, des maux de gorge et de tête, de la fatigue et des pertes de cheveux par endroits. Les éruptions cutanées peuvent facilement être confondues avec d'autres affections de la peau. Ces symptômes disparaissent aussi, même sans traitement, mais l'infection demeure présente dans le sang, les organes et autres tissus. Si l'on ne traite pas cette infection, l'éruption cutanée peut réapparaître l'année suivante ou celle d'après. Pendant cette période, la maladie est très contagieuse;
  - **Latent** : Si la syphilis n'est pas traitée, les germes continuent de se propager sur toutes les parties du corps. Toutefois, la personne infectée ne présente aucun signe visible de la maladie. Grâce à une analyse de sang, on peut savoir si la maladie est toujours présente. De trois à trente ans après la première infection, plusieurs organes du corps peuvent être

touchés, notamment le cœur, les gros vaisseaux sanguins, les os, les articulations ou le système nerveux central.

### **Comment diagnostique-t-on la syphilis?**

Dans le cas d'une syphilis précoce, s'il y a présence d'une plaie ouverte, on peut effectuer un prélèvement à l'aide d'un écouvillon. Une analyse de sang détectera la maladie environ un mois après l'apparition de chancres. Certaines analyses de sang peuvent demeurer positives pour le reste de votre vie une fois que vous avez contracté la syphilis.

### **Comment traite-t-on la syphilis?**

La meilleure façon de traiter la syphilis est de le faire pendant les premiers stades de la maladie afin de prévenir les complications graves et la transmission de la maladie à d'autres personnes. L'injection de pénicilline est le premier traitement effectué. On peut administrer certains autres antibiotiques aux personnes allergiques à la pénicilline. Le traitement guérira la syphilis, mais il ne peut pas supprimer le grand nombre de dommages déjà infligés aux organes internes. Après le traitement, les analyses de sang montreront que la maladie est guérie et qu'il n'y a pas de poussées ou de nouvelle infection. Sans traitement, environ 33 % des personnes infectées présentent de graves complications plus tard dans leur vie.

### **Y a-t-il des complications?**

Si la syphilis est traitée assez tôt, il ne devrait pas y avoir de complications. Sans traitement ou en effectuant un traitement tardif, on peut causer de graves dommages au cœur, aux gros vaisseaux sanguins, au foie et au cerveau. Si elle ne reçoit pas de traitement, une femme enceinte peut transmettre la syphilis à son fœtus. Cela peut entraîner la mort du fœtus ou lui causer de graves dommages. Pendant la grossesse, toutes les femmes sont soumises à un test de dépistage de la syphilis.

### **Comment prévient-on la syphilis?**

- Ne jamais avoir de contacts sexuels avec toute personne présentant une ou des plaie(s) sur ses parties génitales;
- Utiliser des condoms ou des barrières de latex lors de chaque relation sexuelle;
- Restreindre le nombre de partenaires sexuels.

### **Si le diagnostic confirme que vous êtes atteint de syphilis :**

1. Éviter les contacts sexuels, même avec un condom ou une barrière de latex, jusqu'à ce que votre médecin vous confirme que toutes vos analyses de sang sont satisfaisantes;

2. Donner le nom des personnes avec qui vous avez eu des relations sexuelles afin que l'on puisse les contacter pour les inviter à se soumettre à des tests de dépistage ou à se faire traiter le plus vite possible.

*Pour obtenir plus de renseignements :*

- **Contactez le fournisseur de soins de santé de votre région ou téléphonez à la ligne Info-Soins au 1-888-255-1010**